

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-87

N° 12 - 19 AOUT 1983

ÉDITION DU LIMOUXIN

(rédigée en collaboration avec les techniciens de la  
CAVALE, du syndicat de Défense du Cru, et du CIVAM)

TORDEUSE DE LA GRAPPE : Peu de captures de papillons les secteurs de MALRAS et de GAJA.

Il est nécessaire de procéder à l'observation de vos vignes avant de décider un traitement.

OIDIUM : Sur les parcelles non entièrement vérées il faut continuer à assurer la protection si vous arrivez en fin de limite d'efficacité (14 jours)

MILDIU : Procéder à un traitement de couverture à l'aide d'un produit cuprique. Ce traitement sera également appliqué aux jeunes plantations.

CICADELLES : Nous avons pu observer ces ravageurs sur quelques parcelles. En cas de nécessité, intervenez avec Ultracide 20 liquide à raison de 2 litres/hectare, efficace également contre les vers de la grappe.

BOTRYTIS : Dès réception de ce bulletin, traitez vos parcelles de MAUZAC à l'aide d'un fongicide spécifique du botrytis.

vinchlozoline	Ronilan, Ronilan SP
iprodione	Rovral, Kidan
procymidone	Sumisclex

Il faut impérativement intervenir au niveau des grappes et sur chaque face du rang.

Nous ne procédons au calcul du risque pourriture que sur le MAUZAC. Cependant notre conseil peut être étendu aux autres cépages dans les situations réputées sensibles à cette maladie, ou partout où un facteur favorisant existe (mauvais contrôle des vers de la grappe, - oïdium....)

Sur cépages ou situations peu sensibles, mais où un risque existe, en raison de facteurs favorisants, vous pourrez utiliser soit une association cuivre-folpel, cuivre-mancozèbe, soit dichlofluanidée (Euperène).

Tirage du 19 AOUT 1983 - 350 exemplaires

(c) Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - MONTPELLIER 1983

P29